

Behandling med candesartancilexetil (Atacand)

Candesartancilexetil anvendes som forebyggende medicin ved migræne.

Præparatet

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end én sygdom. For eksempel virker Magnyl smertestillende samtidig med, at det virker forebyggende mod blodpropper.

Candesartancilexetil er udviklet til behandling af forhøjet blodtryk, men det har senere vist sig også at have en forebyggende effekt på migræne. Når du får candesartancilexetil, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men for at bedre din migræne.

Bivirkninger

Candesartancilexetil tolereres generelt godt. Præparatet nedsætter sjældent et normalt blodtryk. Hos patienter med lavt blodtryk ses der svimmelhed, når man rejser sig. I sjældne tilfælde kan udslæt, forhøjet kalium i blodet samt nyrepåvirkning og leverpåvirkning forekomme.

Virkningsmekanisme

Candesartancilexetil virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme.

Før behandlingsopstart

Inden du starter på behandlingen, skal der foreligge måling af puls og blodtryk samt følgende blodprøver: Nyre- og væsketal.

Hvilken dosis skal man tage

Normalt starter man med at tage 8 mg en gang dagligt i en uge. Herefter 16 mg dagligt. Der kan trappes yderligere op med 8 mg pr uge til 24 mg eller evt. 32 mg dgl. Der trappes op til den dosis som giver den bedste effekt uden generende bivirkninger.

Ved manglende effekt efter 2 måneder trappes der ned med 8 mg om ugen, til man er helt ude af medicinen.