

Behandling med gabapentin

Gabapentin anvendes til behandling af nervesmerter.

Præparatet

Gabapentin anvendes til at behandle trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og andre nervesmerter. Det bruges desuden til at forebygge epileptiske anfald.

Såfremt gabapentin har god effekt på dine smerter, kan der søges enkelttilskud via Lægemiddelstyrelsen

Virkningsmekaniske

Gabapentin virker ved at stabilisere nervecellerne.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er døsighed, svimmelhed, træthed, kvalme, opkastning, besvær med koordinering af bevægelser og knogleskørhed.

Forsigtighedsregler

- Gabapentin må ikke anvendes, hvis du er gravid eller ammende.
- Dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion og hos ældre.
- Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Før behandlingsopstart

Inden du opstarter behandling med gabapentin, skal du have taget en blodprøve for at sikre at dine nyrer og væsketal er normale.

Hvilken dosis skal man tage

Man starter med 300 mg og øger dosis med 300 mg hvert 3. døgn til effekt eller generende bivirkninger. Tabletterne skal fordeles på 3 doser i døgnet.

En typisk vedligeholdelsesdosis ligger mellem 600 mg og 2400 mg i døgnet, men kan øges helt op til højst 3600 mg (12 kapsler) fordelt på 3 doser.

	Morgen	Middag	Aften
Dag 1-3			300 mg
Dag 4-6	300 mg		300 mg
Dag 7-9	300 mg	300 mg	300 mg
Dag 10-12	300 mg	300 mg	600 mg
Dag 13-15	600 mg	300 mg	600 mg
Dag 16-18	600 mg	600 mg	600 mg

Eventuelt yderligere optrapning efter samme fremgangsmåde afhængig af effekt og bivirkninger og kun efter aftale med lægen. Ved manglende effekt eller betydelige bivirkninger trappes gabapentin ned over mindst 1 uge.