

Eptinezumab (Vyepti)

Fremanezumab bruges til forebyggelse af migræne.

Virkningsmekanisme

Signalstoffet calcitonin gen-relateret peptid (CGRP) findes i nervesystemet og spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. Eptinezumab (det aktive stof i Vyepti) er et antistof, som binder sig til CGRP og forhindrer CGRP i at binde sig til sin receptor. Dette kan nedsætte hyppigheden af migræneanfald.

Bivirkninger

Der er beskrevet irritation af luftveje og træthed. Der kan i sjældne tilfælde forekomme allergiske reaktioner. Oplever du andre bivirkninger, når du har taget Vyepti, er det vigtigt, at du informerer din behandlende læge.

Forsigtighedsregler

Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker prævention, så længe du er i behandling med Vyepti. Du skal vente mindst 5 måneder efter sidste behandling, før du forsøger at blive gravid.

Inden du starter behandling

I Danmark bruges Vyepti til mennesker med kronisk migræne. Du skal have udfyldt din hovedpinekalender i mindst en måned før du starter behandlingen.

Sådan tager man Vyepti

Vyepti indgives intravenøst. Det betyder, at du får medicinen gennem en lille plastikkanyle lagt i en åre. Medicinen indgives over cirka 30 minutter. Du vil få behandlingen under observation af en sygeplejerske. Behandlingen skal tages hver 12. uge.

Når du er i behandling med Vyepti

Du skal udfylde hovedpinekalender så længe du er i behandling med Vyepti. Det er vigtigt, at du medbringer kalenderen hver gang, du kommer til konsultation.

Du skal holde pause med Vyepti når du har været i behandling i halvandet år for at sikre, at du fortsat har behov for behandlingen.

Udlevering af Vyepti

Du får behandlingen på hovedpineklinikken. Behandlingen stoppes, hvis der ikke er tilfredsstillende reduktion af hovedpinen efter 3 måneder.