



# Sammenligning af anfaldsbehandling mod migræne

Diagrammerne viser hvordan forskellige lægemidler til anfaldsbehandling af migræne klarer sig ved sammenligning med sumatriptan. Af hvert diagram ses sandsynligheden for gavnlige effekter (i bunden) og sandsynligheden for bivirkninger (øvrige felter). Procentsatserne angiver hvor stor en andel af de der tager et lægemiddel, som oplever de pågældende gavnlige effekter eller bivirkninger.

Farverne angiver, om det enkelte lægemiddel er bedre (grøn) eller dårligere (rød) end sumatriptan (blå). Farverne viser også, hvor pålidelig hver sammenligning er: Jo mere intens grøn eller rød, jo mere pålidelig. Omvendt betyder en mere hvid nuance, at sammenligningen er mindre pålidelig.

## Ordforklaring

### Smertefri 2 eller 24 timer

Ingen hovedpine henholdsvis 2 eller 24 timer efter indtagelse af lægemidlet.

### Smertelindring


Lindring fra mellemsvær eller svær hovedpine til let eller ingen hovedpine (2 timer).

### Behov for akutmedicin


Det var nødvendigt at tage anden smertestillende for at lindre smerterne.




## Sammenligning af anfaldsbehandling mod migræne Udvalgte Triptaner




SUMATRIPTAN (REFERENCE)




ELETRIPTAN



RIZATRIPTAN




ZOLMITRIPTAN






### Øvrige udvalgte resultater




ACETYLSALICYLSYRE




IBUPROFEN

For ibuprofen var data for smertefrihed efter 24 timer baseret på et enkelt klinisk forsøg med usædvanlig lille placebo-effekt, hvorfor dette estimat bør tages med forbehold.



PARACETAMOL



RIMEGEPANT

